INFORME TÉCNICO





FENFEN

Herbicida residual

FENFEN es un herbicida selectivo de contacto contra malas hierbas anuales (dicotiledóneas y gramíneas) aplicado en post-emergencia precoz (2-3 hojas). También presenta una gran persistencia si se aplica en pre-emergencia.

Aplicaciones autorizadas, dosis y forma de aplicación

Aplicar en pulverización normal contra malas hierbas anuales en pre o postemergencia precoz de las mismas.

- **Ajos**: 1-2 l/ha en pre o post-emergencia cuando tengan más de 10 cm de altura.
- **Alcachofa**: 1-2 l/ha en pre-brotación y 2-4 l/ha en post-brotación en tratamiento dirigido.
- **Algodonero**: 1-2 l/ha en pulverización al suelo cuando el cultivo tenga más de 20 cm de altura.
- Brecol, Coles de bruselas, Coliflor y Repollo: 1-2 l/ha en pre-plantación o post-transplante en tratamiento dirigido cuando el cultivo esté bien enraizado.
- Cebolla: 1-2 l/ha
 - Cebolla de transplante enraizada: cuando tenga 2-4 hojas verdaderas.
 - Cebolla de bulbo: en pre o post-emergencia.
 - Cebolla de grano de siembra directa: en post-emergencia con más de 3 hojas o en dosis fraccionadas en estado de desarrollo más temprano. No aplicar en las 72 horas siguientes a una lluvia o riego por aspersión, ni en semilleros de cebolla ni en cebollinos en post-emergencia. La técnica de aplicación en dosis fraccionadas sólo se realizará bajo asesoramiento de los servicios técnicos del distribuidor.
- **Cítricos**: 2-4 l/ha en pulverización dirigida al suelo.
- **Frutales de hoja caduca**: 2-4 l/ha en pulverización dirigida al suelo sin mojar el tronco. No tratar frutales de hueso a partir del inicio de la brotación.
- **Girasol**: 0,5 l/ha en pre-emergencia. Posible riesgo de fitotoxicidad en caso de lluvias fuertes en los primeros estadios de desarrollo.
- **Melón**: 1-2 l/ha en pre-transplante.

- Olivo: 2-4 l/ha en pulverización dirigida al suelo.
- Platanera: 2-4 l/ha en pulverización dirigida al suelo.
- **Tabaco**: 2-4 l/ha en pulverización al suelo cuando el cultivo tenga más de 20 cm de altura.
- Vid: 2-4 l/ha en pulverización dirigida al suelo.

Precauciones

- El suelo debe estar bien preparado, libre de terrones y de restos vegetales.
- No alomar el cultivo ni trabajar el suelo después de la aplicación.
- Tratar sólo cultivos que se encuentren en perfecto estado de desarrollo vegetativo.
- No se aconseja su mezcla con otros productos fitosanitarios sin prueba previa.
- Para obtener buenos resultados, es necesario que la superficie esté húmeda.
- Utilizar campana protectora y presión baja en caso de tratamiento dirigido al suelo.
- Durante el tratamiento evitar las sobredosificaciones que podrían dañar el cultivo (caso de post-emergencia).
- Evitar la deriva de la nube de pulverización para evitar toda fitotoxicidad en cultivos colindantes.
- Almacenar en lugar fresco, pero no por debajo de 0°C
- Para evitar daños en cultivos posteriores, deberá removerse bien el terreno para eliminar el producto que quede sin degradar en superficie.

Plazo de seguridad

El plazo de seguridad para la recolección o entrada de ganados es de 21 días.

FICHA TÉCNICA

FENFEN

PRODUCTO	Herbicida selectivo de contacto y con gran persistencia contra malas hierbas anuales.
MATERIA ACTIVA	Oxifluorfen: 24% p/v (240 g/l)
FORMULACIÓN	Concentrado emulsionable (EC).
NOMBRE QUÍMICO	2-cloro 1-(3-etoxi 4-nitrofenoxi) 4-(tri-fluorometil) benceno
GRUPO QUÍMICO	Difenil – Éter
FORMULA QUÍMICA	C ₁₅ H ₁₁ Cl F ₃ N O ₄
ASPECTO	Líquido rojizo
pH (1% en agua)	5,0 – 7,0
DENSIDAD	0,94 – 1,04 g/ml
SOLUBILIDAD	Emulsionable en agua
CLASIFICACIÓN TOXICOLÓGICA	Nocivo (Xn) Peligroso para el medio ambiente (N)
RIESGOS MEDIOAMBIENTALES	Mamíferos: A Aves: A Peces: C. Muy peligroso para peces.
NÚMERO REGISTRO	23.917
ENVASES	1 y 5 litros

LAINCO, S.A.

Pol. Ind. Can Jardí - Avda. Bizet, 8-12 - 08191 Rubí (Barcelona) Tel. 93 586 20 15 - Fax 93 586 20 16 E-mail: lainco@lainco.es - http://www.lainco.es